

FOLICIL, comprimidos doseados a 5 mg de Ácido fólico. **Indicações terapêuticas:** Tratamento ou prevenção da deficiência em ácido fólico, especialmente na gravidez, aleitamento e períodos de rápido crescimento. O tratamento com ácido fólico está também indicado na prevenção das malformações do tubo neural (espinha bífida, meningocelo, anencefalia) especialmente em mulheres com história prévia de filho (ou feto) com estas malformações. Tendo em conta que a administração prolongada de barbitúricos, anticonvulsivantes, antimaláricos, laxantes, contraceptivos orais e alguns agentes quimioterápicos podem causar deficiência iatrogénica de folatos, recomenda-se a administração de FOLICIL nestas situações.

Posologia e modo de administração: *Adultos:* 1/2 a 1 comprimido, uma ou duas vezes por dia, de acordo com a situação clínica. Prevenção das malformações do tubo neural: 1/2 comprimido por dia, um mês antes da concepção e durante o primeiro trimestre da gravidez. *Crianças:* Metade da dose do adulto. **Contraindicações:** Hipersensibilidade ao ácido fólico ou a qualquer dos excipientes. **Efeitos indesejáveis:** As reações adversas listadas por frequência (*muito frequentes:* $\geq 1/10$, *frequentes:* $\geq 1/100$ a $< 1/10$, *pouco frequentes:* $\geq 1/1,000$ a $< 1/100$, *raros:* $\geq 1/10,000$ a $< 1/1,000$, *muito raros:* $< 1/10,000$), incluindo relatos isolados; frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis) foram as seguintes: *Doenças do sistema imunitário:* *Raros* - Reações de hipersensibilidade, que se manifestam por eritema, febre, prurido ou broncospasmo. *Frequência desconhecida:* reação anafilática. **Data da revisão do texto:** 08/2018. **Apresentação:** cx. 20 e 60 comprimidos. **Comparticipação:** Portugal - 37% (RG), 52% (RE). **Medicamento sujeito a receita médica.** Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL – Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar o Gabinete de Farmacovigilância de BIAL - Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com. **Titular da AIM:** Bialport - Produtos Farmacêuticos, S.A. - À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal • NIPC 504404512 • DDVSAM181015