

FOLIFER, comprimido revestido por película, contendo 1 mg de ácido fólico + 90 mg de Ferro (sob a forma de sulfato ferroso). **Indicações terapêuticas:** Prevenção e tratamento dos estados de carência em ferro e ácido fólico na gravidez, no aleitamento e no puerpério. **Posologia e modo de administração:** 1 comprimido por dia, antes das refeições ou durante as refeições, dependendo da tolerância gastrointestinal. Os comprimidos não devem ser chupados, mastigados nem mantidos na boca, devendo antes ser engolidos inteiros com água. **Contraindicações:** Hipersensibilidade ao ácido fólico ou ao ferro ou a qualquer um dos excipientes. Excesso de ferro no organismo (ex. hemocromatose, hemossiderose). Doentes submetidos a transfusões de sangue repetidas. Anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. Terapêutica parentérica concomitante com ferro. **Efeitos indesejáveis:** As reações adversas listadas por frequência (*muito frequentes: $\geq 1/10$, frequentes: $\geq 1/100$ a $< 1/10$, pouco frequentes: $\geq 1/1,000$ a $< 1/100$, raros: $\geq 1/10,000$ a $< 1/1,000$, muito raros: $< 1/10,000$* , incluindo relatos isolados; Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis) foram as seguintes: *Doenças gastrointestinais:* *Frequentes:* dor abdominal, pirose, náusea, vômitos, obstipação ou diarreia (relacionados com a ingestão de ferro). Fezes escuras (relacionadas com a excreção de ferro). *Frequência desconhecida:* ulceração da boca (no contexto de administração incorreta, quando os comprimidos são mastigados, chupados ou mantidos na boca). *Doenças do sistema imunitário:* *Raros* - Reações alérgicas, especificamente, broncospasmo, eritema, rash cutâneo ou prurido. *Frequência desconhecida:* reação anafilática. **Data da revisão do texto:** 08/2018. Apresentação: cx. 20 e 60 comprimidos. **Comparticipação:** Portugal - 37% (RG), 52% (RE). **Medicamento sujeito a receita médica.** Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL - Portela & C^a., S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar o Gabinete de Farmacovigilância de BIAL - Portela & C^a., S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com. **Titular da AIM:** Bialport - Produtos Farmacêuticos, S.A. - À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal • NIPC 504404512. DDVSAM181015